

CLAVE PARA LAS ESPECIES VENEZOLANAS DE *ACALYPHA*

Clave de los subgéneros

1. Flores femeninas pediceladas, cáliz de 4 ó 5 sépalos; brácteas inconspicuas, no acrecentes en el fruto subgén. *Linostachys*
1. Flores femeninas sésiles, cáliz de 3 sépalos; brácteas grandes, foliáceas, acrecentes en el fruto subgén. *Acalypha*

Subgénero *Linostachys*

1. Lámina foliar palmatinervia 2
1. Lámina foliar pinnatinervia 3. *A. longipetiolata*
2. Planta con diminutas gotas esféricas de aspecto resinoso, principalmente en el envés foliar; estípulas subuladas de menos de 1 mm de ancho 1. *A. villosa*
2. Planta sin gotas de aspecto resinoso; estípulas triangular-lanceoladas de más de 2 mm de ancho 2. *A. muelleriana*

Subgénero *Acalypha*

1. Hierbas o sufrútices 2
1. Arbustos o árboles 8
2. Inflorescencias femeninas densifloras, elipsoides o cilíndricas, que no dejan ver el eje 3
2. Inflorescencias femeninas laxifloras, con el eje bien visible 5
3. Brácteas femeninas con dientes terminados en una arista de hasta 6 mm de largo 4
3. Brácteas femeninas con dientes triangulares, sin arista 6. *A. poiretii*
4. Ramas jóvenes y hojas sin pelos glandulíferos; lámina foliar con ápice agudo; estilos ramificados 4. *A. arvensis*
4. Ramas jóvenes y hojas con pelos glandulíferos; lámina foliar con ápice acuminado; estilos no ramificados 5. *A. alopecuroides*
5. Inflorescencias femeninas terminales; brácteas hendidas en más de 1/2 de su longitud, con dientes filiformes 6
5. Inflorescencias femeninas axilares; brácteas hendidas en c. 1/4 de su longitud, con dientes triangulares 7

6. Dientes de las brácteas hispídulos; ovario y cápsula papilosos y glabros 8. *A. carrrascoana*
6. Dientes de las brácteas glabros; ovario y cápsula híspidos o hispídulo 7. *A. setosa*
7. Planta con indumento glandular en ramas jóvenes, hojas e inflorescencias ... 10. *A. plicata*

7. Planta con indumento glandular sólo en las inflorescencias 9. *A. cuspidata*
8. Inflorescencias femeninas o andróginas terminales 9
8. Inflorescencias femeninas o andróginas axilares 10
9. Ramas con indumento glandular laxo; las brácteas acrecentes no llegan a cubrir el fruto; cápsula papiloso-muricada 12. *A. venezuelica*
9. Ramas eglandulares; las brácteas acrecentes cubren el fruto; cápsula sin papillas 11. *A. schiedeana*
10. Inflorescencias andróginas y unisexuales 11
10. Inflorescencias solo unisexuales 14
11. Lámina foliar generalmente triangular-lanceolada, palmatinervia 12
11. Lámina foliar elíptico-lanceolada u oblongo-lanceolada, pinnatinervia 13
12. Planta con indumento glandular en ramas jóvenes, hojas e inflorescencias 10. *A. plicata*
12. Planta con indumento glandular solo en las inflorescencias 9. *A. cuspidata*
13. Pecíolos generalmente de más de 1 cm de largo; estípulas subuladas, de más de 4 mm de largo; brácteas femeninas con (1)2-3 flores 13. *A. diversifolia*
13. Pecíolos de menos de 5 mm de largo; estípulas diminutas, generalmente menores de 1 mm de largo; brácteas femeninas unifloras 14. *A. tenuifolia*
14. Lámina foliar pinnatinervia 15
14. Lámina foliar palmatinervia 17
15. Inflorescencias femeninas densifloras, que no dejan ver el eje 19. *A. hispida*
15. Inflorescencias femeninas laxifloras, con el eje bien visible 16
16. Lámina foliar generalmente obovada y subcuneada; inflorescencias femeninas de 7-15 cm de largo 15. *A. cuneata*
16. Lámina foliar de ovado a oblongo-lanceoladas, base de redondeada a subcordada; inflorescencias femeninas de 25-40 cm de largo 16. *A. scandens*
17. Lámina foliar generalmente variegada; inflorescencias femeninas de hasta 10 cm de largo 18. *A. amentacea* subsp. *wilkesiana*
17. Lámina foliar no variegada; inflorescencias femeninas de m s de 15 cm de largo 17. *A. macrostachya*