

30. *A. coleispica* Pax et K. Hoffm. n. spec. — Caules elati, tomentelli, ramosi. Petiolus 4—3 cm longus, tomentellus; limbus 5—7 cm longus, 3—4 cm latus, trianguli-ovatus, acuminatus, basi rotundata cordatus, crenatus, membranaceus, supra et subtus molliter pubescens, basi 5-nervius. Flores monoici. Spicae omnes androgynae, terminales et axillares, ad 8 cm longae, aut maxima parte ♂, aut ♀ et apice brevius ♂, aut ♀ et in setam sterilem apice clavatam abeuntes, basi longius breviusve nudae, tomentellae; bracteae ♀ 6—7 mm latae, rotundatae, tomentellae, margine glandulis sessilibus vel brevissime stipitatis ciliatae, uniflorae, ad $\frac{1}{3}$, 7—9-dentatae, dentibus ovatis, acutis. Sepala ♀ ovata, acuta; ovarium hirtum; styli 6 mm longi, longe pinnatum ± 10-lacinulati. Capsula tuberculata.

Provinz des tropischen Zentralamerika. Mexiko, ohne Standortsangabe
(Sammlername unleserlich, vielleicht Sommerschuh!)

Nota. Verisimiliter ad hanc speciem pertinet *A. Botteriana* var. *pubescens* Müll. Arg. in
DC. Prodr. XV. 2. (1866) 875.