

Var. ζ . *hirtiformis* Pax et K. Hoffm. n. var. — Ramuli cum petiolis breviter tomentelli, interdum \pm villosuli. Petiolus insigniter longus; limbus late ovatus, basi cordatus, magnus, tenuiter membranaceus, juvenilis pubescens, demum glabrescens, in costis puberulus. — *A.* var. *hirta* recedit foliorum consistentia et indumento molli.

Brasilien: Matto Grosso, Cuyaba (Malme n. 3039!).

Var. η . *saltensis* Pax et K. Hoffm. n. var. — *A. gracilis* Griseb. in Abh. Gesellsch. Wiss. Göttingen XXIV. (1879) 59. — Frutex ad $4\frac{1}{2}$ m altus; ramuli breviter puberuli. Petiolus 4—6 cm longus; limbus 7—13 cm longus, 2— $4\frac{1}{2}$, rarius ad 7 cm latus, ovato-lanceolatus vel ovatus, basi obtusus, interdum cordatus, evolutus in costis parce pilosus, ceterum glaber, tenuiter membranaceus.

Argentinien: Salta, San José, Ufergebüsche (Lorentz u. Hieronymus n. 230!, 240!, 257!, 259!). Brasilien, Matto Grosso, Cuyaba (Malme!).