

12. **A. echinus** Pax et K. Hoffm. n. spec. — Frutex; rami parce pilosi, mox glabrati. Petiolus 1—2½ cm longus, hirtopilosus, glabrescens; limbus circ. 40 cm longus, 5—6 cm latus, ovatus, obtuse acuminatus, apice emarginatus et mucronatus, basi attenuata obtusus et subcordatus, leviter grossiuscule crenatus, firme membranaceus, evolutus glaber et in axillis nervorum subtilis barbatus, basi trinervius, ceterum penninervius; costae praeter costas basales 5; stipulae circ. 3 mm longae, e basi dilatata subulatae, rigidae, subpungentes, persistentes. Flores dioici vel submonoici. Paniculae ♀ axillares, contracto-racemiformes, ± 40 cm longae, glabrae; bractae primariae parvae, 1 mm longae, triangulari-ovatae, denticulatae, pluriflorae; bracteolae minores; pedicelli ♀ demum 5—7 mm longi, filiformes, articulati. Sepala ♀ 5, lanceolato-ovata, acuminata; ovarium 2—3-loculare, dense echinatum, echinis glandula sessili terminatis; styli 4 mm longi, longiuscule, fere ad basin 40—45-lacinulati. Capsula 3 mm lata. Flos ♂ unus tantum visus, inter flores ♀ situs. Sepala ♂ 3, glabra; stamina circ. 5; antherae loculi oblongi, penduli.

Ostafrikanische Steppenprovinz. Deutsch-Ostafrika, Pangani (Stuhlmann n. 493!).