

29. **A. guatemalensis** Pax et K. Hoffm. n. spec. — Perennis; radix lignosa; caules ad $1\frac{1}{2}$ m alti, adscendentes, inferne ramosi, apice adpresse puberuli, $\pm$ glabrescentes. Petiolus $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ cm longus, pubescens; limbus 4—7 cm longus, 2— $3\frac{1}{2}$ cm latus, rhombeo-ovatus, acuminatus, basi obtusus, crenatus, tenuiter membranaceus, evolutus subglaber et in costis parce pilosus, basi 5-nervius. Flores monoici. Spicae androgynae, terminales et numerosae axillares, illae 4—5 cm longae, posteriores breviores et saepe omnino ♀, omnes pedunculatae vel subsessiles; pars ♂ 1— $1\frac{1}{2}$ cm longa; bractee ♀ infimae laxae, fructigerae circ. 5 mm latae, ad medium 5—7-lobae, subsetosae, et breviter stipitato-glandulosae, 1—2-florae, lobis lanceolatis. Sepala ♀ ovata, acuta; ovarium hirtum; styli 5—7 mm longi, longe pinnatim $\pm$ 6—10-lacinulati, basi nudi. Capsula tuberculata, circ. 3 mm diametens. Semina ovoidea, acuta, laevia, 2 mm longa.

Provinz des tropischen Zentralamerika. Guatemala: Huehuetenango, Jacaltenango, schattige Wegränder (Seler n. 3261!); Tcocinte (Heyde u. Lux n. 6233!); Baja Verapaz, Santa Rosa, 1600 m (v. Türckheim n. II. 2340!).